САКСЕССОР™

Гербіцид

FMC An Agricultural Sciences Company

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРБІЦИДУ САКСЕССОР™

Діюча речовина	петоксамід – 600 г/л
Препаративна форма:	концентрат емульсії
Норма використання:	1,5 – 2,0 л/га
Хімічний клас:	хлорацетаміди
Пакування:	5 та 10 л
Термін зберігання:	2 роки

СХВАЛЕНА В ЄС ДІЮЧА РЕЧОВИНА

Саксессор™ створено на основі петоксаміду – нової для ринку України молекули, схваленої до використання в ЄС.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Петоксамід належить до хімічного класу хлорацетамідів – HRAC/WSSA Група 15. Інгібує синтез жирних кислот із дуже довгим ланцюгом (VLCFA), порушуючи процеси росту й розвитку проростків бур'янів.

СПЕКТР ДІЇ

Однорічні одно- та деякі дводольні бур'яни.

ПЕРЕВАГИ ГЕРБІЦИДУ


- Петоксамід у складі **Саксессор™** – відповідність суворим вимогам ЄС для впевненості у безпеці та якості врожаю.
- Селективність – висока селективність щодо соняшнику, кукурудзи та озимого ріпаку.
- Тривалий контроль – захист упродовж гербокритичного періоду та зменшення конкуренції бур'янів із культурою.
- Гнучкість застосування – на кукурудзі й озимому ріпаку; виключно досходово на соняшнику.
- Застосування – самостійно або в бакових сумішах.
- Управління резистентністю – HRAC/WSSA Група 15, механізм дії, відмінний від ALS-інгібіторів.

САКСЕССОР™ – СПЕКТР КОНТРОЛЬОВАНИХ БУР'ЯНІВ

Амброзія полинолиста	Лобода біла
Вероніка персидська	Мак дикий
Воловик польовий	Мак польовий
Волошка синя	Мишій (види)
Галінсога дрібноквіткова	Незабудка польова
Герань маленька	Нетреба звичайна
Герань розсічена	Осот городній (з насіння)
Гібіск трійчастий	Осот рожевий (з насіння)
Гірчак березковидний	Пальчатка (види)
Гірчиця польова	Паслін чорний
Горошок мишачий	Підмаренник чіпкий
Грицики звичайні	Роман польовий
Гірчак шорсткий	Ромашка види
Дурман звичайний	Рутка лікарська
Жабрій звичайний	Сорго алепське (з насіння)
Жовтозілля звичайне	Спориш звичайний
Зірочник середній	Талабан польовий
Канатник Теофраста	Тонконіг звичайний
Кропива глуха	Фіалка польова
Куряче просо	Щириця жминдовидна
Курячі очка польові	Щириця гібридна
Лептохлоа різноманітна	Щириця розлога (звичайна)

високочутливі чутливі та середньочутливі

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИ КЛЮЧОВИХ БУР'ЯНІВ



РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ САКСЕССОР™

Культура	Норма витрати, л/га	Спектр дії	Спосіб та строки застосування	Кратність обробок
Кукурудза	1,5 - 2,0	Одно- та дводольні бур'яни	• досходово – після посіву до появи сходів • ранньопіслясходово – у фазі 2–4 листків включно	1
Ріпак озимий			• досходово – після посіву та до появи сходів ріпаку • ранньопіслясходово – до фази 4 справжніх листків ріпаку включно	1
Соняшник			• досходово – після посіву до появи сходів	1

Будь ласка застосовуйте продукти відповідально та безпечно.
Дотримуйтесь рекомендацій виробника, що вказані на етикетці.


ag.fmc.com/ua/uk

САКСЕССОР™

Гербіцид

FMC An Agricultural Sciences Company


САКСЕССОР™ У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ




- **Саксессор™** – гнучкий компонент комплексних програм гербіцидного захисту соняшнику.
- Препарат може застосовуватися як самостійно, так і в бакових та послідовних програмах із гербіцидами залежно від спектра та рівня забур'яненості, ґрунтово-кліматичних умов і технології вирощування.
- **Саксессор™** Т може бути інтегрований у системи захисту гібридів соняшнику, стійких до трибенурон-метилу та гербіцидів **Express®** / **Express®** Gold, як ефективний компонент комплексної програми до- та післясходового контролю бур'янів.

САКСЕССОР™ У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ

- Основне вікно застосування **Саксессор™** на кукурудзі – досходове: обприскування після посіву та до появи сходів культури (самостійно або в бакових сумішах).
- За потреби можливе раннє післясходове застосування у фазі 2-4 листків кукурудзи (самостійно або в бакових сумішах) – до або під час появи сходів бур'янів.



САКСЕССОР™ У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ РІПАКУ ОЗИМОГО



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ САКСЕССОР™

- **Саксессор™** ефективний як проти злакових, так і проти широкого спектра дводольних бур'янів.
- Основними умовами для якісної роботи препарату є достатня вологість та ретельно підготовлений ґрунт.
- Значна кількість пожнивних решток на поверхні ґрунту може негативно впливати на ефективність препарату.
- Бур'яни, які вже проросли, чутливі до препарату до стадії сім'ядолей (максимум – фаза 2 листків); ті, що проростають пізніше, стримуються ґрунтовою дією препарату тривалістю до 6 тижнів.
- У разі обприскування за умов низької вологості ґрунту гербіцид здатний реактивуватися (відновити дію), якщо опади пройдуть упродовж 5-7 днів після застосування.

Будь ласка застосовуйте продукти відповідально та безпечно.
Дотримуйтесь рекомендацій виробника, що вказані на етикетці.

ag.fmc.com/ua/uk