Імпульс.
Рух.
Напрямок.

FMC An Agricultural Sciences Company



Саксессор™ Т

Гербіцид



Імпульс.
Рух.
Напрямок.

FMC An Agricultural Sciences Company

Саксессор™ Т

Гербіцид

Саксессор™ Т допомагає створити сприятливі умови для раннього розвитку соняшнику, кукурудзи та сої — культур, від яких очікують не лише впевненого старту, а й реалізації їхнього потенціалу. Надійний захист посівів сприяє формуванню врожаю належної кількості та якості, відкриваючи йому шлях далі — від поля до ринку.
Діючі речовини Саксессор™ Т схвалені в ЄС, що сприяє безперешкодному руху вирощеної продукції та продуктів її переробки, зокрема до країн Європейського Союзу.

Імпульс. Рух. Напрямок.

FMC An Agricultural Sciences Company

- **Імпульс** — для впевненого старту.
  - Саксессор™ Т застосовується на соняшнику, кукурудзі та сої*, створюючи сприятливі умови для їхнього раннього розвитку.
- **Рух** — до реалізації потенціалу.
  - Надійний захист посівів допомагає культурам розвиватися та формувати врожай належної кількості й якості.
- **Напрямок** — далі, до ринку.
  - Діючі речовини Саксессор™ Т схвалені в ЄС, що сприяє безперешкодному руху вирощеної продукції та продуктів її переробки, зокрема до країн Європейського Союзу.

Саксессор™ Т — від правильного старту до правильного напрямку.



FMC An Agricultural Sciences Company

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРБІЦИДУ САКСЕССОР™ Т

Діючі речовини:	петоксамід – 300 г/л, тербутилазин – 187,5 г/л
Препаративна форма:	CE (суспо - емульсія)
Норма використання:	3,0–4,0 л/га
Хімічний клас:	хлорацетаміди, триазини
Паковання:	каністра 10 л; коробка 2 х 10 л
Термін зберігання:	2 роки



Саксессор™ Т створено на основі двох діючих речовин, схвалених у ЄС: петоксаміду — інноваційної для України молекули з групи хлорацетамідів, та тербутилазину.

Позиціонується для використання самостійно або у комбінованих програмах.

Подвійний механізм дії

FMC An Agricultural Sciences Company

Саксессор™ Т створено на основі двох діючих речовин, схвалених у ЄС: петоксаміду — інноваційної для України молекули з груп хлорацетамідів, та тербутилазину

ПЕТОКСАМІД (HRAC/WSSA Група 15)

- Спрямований насамперед на контроль злакових бур'янів, а також контролює низку важливих видів дводольних.
- Належить до хімічного класу хлорацетамідів.
- Виступає інгібітором синтезу жирних кислот із дуже довгим ланцюгом (VLCFA). Речовина блокує процеси поділу та росту клітин у проростках.

ТЕРБУТИЛАЗИН (HRAC/WSSA Група 5)

- Спрямований насамперед на контроль широкого спектру дводольних бур'янів, доповнюючи захист проти частини однорічних злакових.
- Представник хімічного класу триазинів.
- Механізм полягає в інгібуванні фотосинтезу на рівні фотосистеми II (PS II) шляхом зв'язування з D1-білком.
- Це призводить до зупинки транспортного ланцюга електронів, накопичення активних форм кисню та подальшого руйнування клітинних мембран.

Саксессор™ Т: регламенти застосування

FMC An Agricultural Sciences Company

Культура	Норма витрати препарату	Спектр дії	Спосіб та строки застосування	Кратність обробок
Соняшник	**3,0 - 4,0 л/га**	**Однорічні одно- та дводольні бур'яни**	➢ досходово — після посіву до появи сходів	**1**
Кукурудза			➢ досходово — після посіву та до появи сходів ➢ ранньопіслясходово — до фази 4 справжніх листків культутри включно	
Соя* (розширення реєстрації очікується у 2027 році)			➢ досходово — після посіву до появи сходів	

Основне вікно застосування Саксессор™ Т — досходове.
На кукурудзі – можливе застосування в ранній післясходовий період.

Саксессор™ Т: переваги використання

- **Застосування гербіциду Саксессор™ Т:**
  - забезпечує надійний контроль чутливих бур’янів впродовж гербокритичного періоду
  - сприяє збереженню густоти стояння культурних рослин
  - усуває конкуренцію бур’янів із культурою за світло, вологу й поживні речовини
  - сприяє формуванню сприятливих умов для раннього розвитку соняшнику, кукурудзи й сої, відповідно, реалізації їхнього потенціалу врожайності.

Саксессор™ T: переваги використання

- **Інноваційна комбінація:** поєднання двох діючих речовин, схвалених у ЄС, із різними та взаємодоповнюючими механізмами дії.
- **Широкий спектр:** ефективний контроль широкого спектра однорічних злакових і дводольних бур’янів, включаючи проблемні види.
- **Тривала захисна дія:** ґрунтова активність забезпечує тривалий захист посівів та контроль бур’янів упродовж гербокритичного періоду.
- **Висока селективність:** м’яка дія на культури за дотримання регламенту застосування.
- **Стримування розвитку резистентності** — два механізми дії, відмінні від ALS-інгібіторів – інструмент для запобігання розвитку резистентності у бур’янів у сівозміні

Спектр контрольованих бур’янів

FMC An Agricultural Sciences Company

САКСЕССОР™ Т – СПЕКТР КОНТРОЛЬОВАНИХ БУР’ЯНІВ

ОДНОРІЧНІ ЗЛАКОВІ

Мишій, види
Плоскуха звичайна
Пальчатка, види

ОДНОРІЧНІ ДВОДОЛЬНІ

Амброзія полинолиста
Вероніка, види
Галінсога дрібноквіткова
Герань, види
Гібіск трійчастий
Гірчиця польова
Грицики звичайні
Гірчак, види
Дурман звичайний
Жабрій, види
Зірочник середній
Канатник Теофраста
Кучерявець Софії
Лобода, види
Лутига, види
Нетреба звичайна
Осот жовтий городній
Падиця ріпаку
Паслін чорний
Підмаренник чіпкий
Ромашка, види
Роман польовий
Талабан польовий
Щириця, види
Чорнощир, види

- Перелік (не повний) включає:
  - основні види – характерні для посівів соняшнику, кукурудзи, сої - однорічні злакові та дводольні види бур’янів
  - високочутливі та чутливі види бур’янів
  - в т.ч. «крупнонасінні», проблемні/високорослі:
    - Амброзія полиноста
    - Дурман звичайний
    - Канатник Теофраста
    - Нетреба звичайна
    - Чорнощир, види
    - Лобода / Лутига, види
    - Паслін чорний
    - Щириця, види




FMC An Agricultural Sciences Company

САКСЕССОР™ Т У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

Саксессор™ Т
3,0 - 4,0 л/га

Експрес™ 75, ВГ – 30-50 г/га
або Експрес™ Голд 75, ВГ – 35-40 г/га
або Сальса™ 75, ЗП – 25 г/га
+ ПАР Тренд® 90 – 0,25-0,3 л/га




- **Саксессор™ Т** – гнучкий компонент комплексних програм гербіцидного захисту соняшнику.
- Препарат може застосовуватися як самостійно, так і в бакових та послідовних програмах із гербіцидами залежно від спектра та рівня забур'яненості, ґрунтово-кліматичних умов і технології вирощування.
- **Саксессор™ Т** може бути інтегрований у системи захисту гібридів соняшнику **ExpressSun™**, **HTS** та інших гібридів, адаптованих до гербіцидів **Express®**, **Express® Gold**, як компонент комплексної програми до- та післясходового контролю бур'янів.



FMC An Agricultural Sciences Company

САКСЕССОР™ Т У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ



- Основне вікно застосування **Саксессор™ Т** на кукурудзі – досходове: обприскування після посіву до появи сходів культури.
- За потреби, можливе раннє післясходове внесення (у фазу 2–4 листків кукурудзи).
- За умов післясходового застосування найкращий ефект досягається проти однорічних злакових бур'янів на стадії проростання – перший листок, а проти дводольних – на стадії сім'ядолей.
- В ситуації коли бур'яни переросли, гербіцид використовується в бакових сумішах.

САКСЕССОР™ Т У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ СОЇ*


*розширення реєстрації очікується у 2027 році

Комманд® 0,15-0,2 л/га + Саксессор™ 1,5-2,0 л/га

Комманд® 0,15-0,2 л/га + Бентазон-вмісний гербіцид (1,5-2 л/га)

Саксессор™ Т 3,0-4,0 л/га

Хармоні® 8 г/га + ПАР Тренд™ 90 0,2-0,3 л/га



Саксессор™ Т: рекомендації щодо використання

FMC An Agricultural Sciences Company

- Основними умовами для якісної роботи препарату є достатня вологість та ретельно підготовлений ґрунт.
- Значна кількість пожнивних решток на поверхні ґрунту може негативно впливати на ефективність препарату.
- Бур'яни, які вже проросли, контролюються до стадії сім'ядолей (макс. стадія 2 листків), бур'яни, які проростають пізніше, утримуються залишковим ефектом, який триває до 6 тижнів.
- У разі обприскування за умов низької вологості ґрунту гербіцид здатний реактивуватися (відновити дію), якщо опади пройдуть упродовж 5-7 днів після застосування.
- Рекомендована норма виливу робочого розчину 200-350 л/га. Для внесення рекомендується використовувати двоплощинні форсунки (наприклад, IDTA або IDKT) з розміром крапель близько 450–600 мкм, що забезпечують рівномірне покриття поверхні ґрунту та мінімізують знесення.

Імпульс.
Рух.
Напрямок.

FMC An Agricultural Sciences Company



Саксессор™ Т

Гербіцид