

Від поля — до врожаю.
Від урожаю — до світових ринків.

FMC An Agricultural Sciences Company

Саксессор™

Гербіцид



Від поля — до врожаю.
Від урожаю — до світових ринків.

FMC An Agricultural Sciences Company

Саксессор™

Гербіцид

Саксессор™ допомагає створити сприятливі умови для раннього розвитку культури, забезпечуючи ґрунтовий контроль однорічних злакових і дводольних бур’янів. Містить петоксамід — діючу речовину класу хлорацетамідів, схвалену в ЄС та нову для ринку України. Є компонентом системи захисту та партнером у досходових і ранніх післясходових гербіцидних сумішах, сприяючи формуванню чистих посівів, реалізації потенціалу врожайності та розширенню експортних можливостей.



FMC An Agricultural Sciences Company

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРБІЦИДУ САКСЕССОР™

Діюча речовина	петоксамід – 600 г/л
Препаративна форма:	концентрат емульсії
Норма використання:	1,5 – 2,0 л/га
Хімічний клас:	хлорацетаміди
Паковання:	5 та 10 л
Термін зберігання:	2 роки



Петоксамід — схвалений для використання у країнах ЄС.

Саксессор™ — зареєстрований в Україні.

Саксессор™: позиціонування

- Ґрунтовий гербіцид **Саксессор™** містить **петоксамід** - нову на ринку України діючу речовину групи хлорацетамідів (HRAC/WSSA Група 15) від компанії FMC.

Саксесор™ контролює:

  - злакові види: куряче просо (плоскуха), пальчатка криваво-червона, тонконіг (види), мишій (види).
  - чутливі дводольні: ромашка (види), щириця (види), гірчак (види), паслін чорний, амброзія полинолиста, та багато інших

- Позиціонується для використання в бакових сумішах (оптимально) або самостійно.
- Гнучкість у гербіцидних програмах — ефективний партнер для досходових і ранніх післясходових сумішей гербіцидів.

Саксессор™: переваги використання

FMC An Agricultural Sciences Company

- **Multi crop**: соняшник – кукурудза – ріпак озимий, (соя).
- **Селективність** — висока селективність щодо соняшнику, кукурудзи та озимого ріпаку.
- **Тривалий контроль** — захист упродовж гербокритичного періоду (до 6 тижнів) та зменшення конкуренції бур'янів із культурою за воду, світло, елементи живлення.
- **Гнучкість застосування**
  - ➢ на кукурудзі й озимому ріпаку – досходово та ранньопіслясходово
  - ➢ виключно досходово на соняшнику.
- **Застосування самостійно та в бакових сумішах в посівах наступних культур з гербіцидами на основі:**
  - Соняшнику: прометрину, тербутилазину, аклоніфену, пендиметаліну.
  - Кукурудзи; тербутилазину (Саксессор™ Т), мезотріону.
  - Ріпаку озимого: кломазону (Комманд™).
  - (Соя): кломазону (Комманд™), метрибузину, прометрину, тербутилазину (Саксессор™ Т).
- **Стримування розвитку резистентності** — HRAC/WSSA Група 15, механізм дії, відмінний від ALS-інгібіторів – інструмент для запобігання розвитку резистентності у бур'янів, особливо щодо видів злакових та видів щириці.

Саксессор™: регламенти застосування

Культура	Норма витрати препарату	Спектр дії	Спосіб та строки застосування	Кратність обробок
Кукурудза	**1,5 - 2,0 л/га**	**Одно- та дводольні бур'яни**	➢ досходово — після посіву до появи сходів ➢ ранньопіслясходово — у фазі 2–4 листків включно	**1**
Ріпак озимий			➢ досходово — після посіву та до появи сходів ріпаку ➢ ранньопіслясходово — до фази 4 справжніх листків ріпаку включно	
Соняшник			➢ досходово — після посіву до появи сходів	

Основне вікно застосування Саксессор™ — досходове.

Спектр контрольованих бур’янів

FMC An Agricultural Sciences Company


Амброзія полинолиста	++	Мак польовий	++
Воловик польовий	+++	Мак дикий	++
Галінсога дрібноквіткова	+++	Мишій, види	+++
Герань маленька та розсічена	+++	Незабудка польова	++
Гібіск трійчастий	+++	Нетреба звичайна	++
Гірчак березковидний	++	Осот рожевий (з насіння)	+++
Гірчак шорсткий та почечуйний	++	Пальчатка криваво-червона	+++
Гірчиця польова	+++	Переліска однорічна	+++
Горошок мишачий	+++	Паслін чорний	++
Грицики звичайні	++	Підмаренник чіпкий	++
Гусимка Таля	++	Роман польовий	+++
Дурман звичайний	++	Ромашка, види	+++
Жабрій звичайний	+++	Рутка лікарська	+++
Жовтозілля звичайне	+++	Сорго алепське (з насіння)	+++
Зірочник середній	+++	Спориш звичайний	++
Канатник Теофраста	++	Талабан польовий	++
Кропива глуха пурпурова	++	Тонконіг звичайний	+++
Куряче просо (плоскуха)	+++	Фіалка польова	++
Курячі очка польові	+++	Чорнощир, види	++
Кучерявець Софії	+++	Щириця жминдовидна	++
Лобода біла	++	Щириця розлога	++
Лутига розлога	++	Щириця звичайна	++

Високочутливі та чутливі види

Середньочутливі види



САКСЕССОР™ У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ РІПАКУ ОЗИМОГО




- Препарат застосовується як самостійно (одразу після сівби чи до сходів), так і в бакових сумішах або послідовних програмах із партнерськими гербіцидами, наприклад Сальса®залежно від забур’яненості та ґрунтово-кліматичних умов.
- **Найкращим та найбільш оптимальним партнером для бакових сумішей є гербіцид Комманд®**, що дозволяє досягти максимального синергізму та розширити спектр контролю складних дводольних та злакових видів бур’янів.

- **Саксессор®** успішно інтегрується в сучасні системи захисту озимого ріпаку, виступаючи надійним базисом для комбінованого до- та післясходового контролю бур'янів.
- Застосування препарату створює тривалий ґрунтовий екран проти однорічних злакових та дводольних бур’янів, знімаючи конкуренцію на стартових етапах та забезпечуючи оптимальний розвиток культури перед зимівлею.



FMC An Agricultural Sciences Company

САКСЕССОР™ У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ




- **Саксессор™** – гнучкий компонент комплексних програм гербіцидного захисту соняшнику.
- Препарат може застосовуватися як самостійно, так і в бакових та послідовних програмах із гербіцидами залежно від спектра та рівня забур'яненості, ґрунтово-кліматичних умов і технології вирощування.
- **Саксессор™** Т може бути інтегрований у системи захисту гібридів соняшнику, стійких до трибенурон-метилу та гербіцидів **Express®** / **Express®** Gold, як ефективний компонент комплексної програми до- та післясходового контролю бур'янів.



FMC An Agricultural Sciences Company

САКСЕССОР™ У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ

- Основне вікно застосування **Саксессор™** на кукурудзі – досходове: обприскування після посіву та до появи сходів культури (самостійно або в бакових сумішах).
- За потреби можливе раннє післясходове застосування у фазі 2–4 листків кукурудзи (самостійно або в бакових сумішах) – до або під час появи сходів бур'янів.



Саксессор™: рекомендації щодо використання

FMC An Agricultural Sciences Company

- Основними умовами для якісної роботи препарату є достатня вологість та ретельно підготовлений ґрунт.
- *Значна кількість пожнивних решток на поверхні ґрунту може негативно впливати на ефективність препарату.*
- Бур'яни, які вже проросли, контролюються до стадії сім'ядолей (макс. стадія 2 листків), бур'яни, які проростають пізніше, утримуються залишковим ефектом, який триває до 6 тижнів.
- У разі обприскування за умов низької вологості ґрунту гербіцид здатний реактивуватися (відновити дію), якщо опади пройдуть упродовж 5-7 днів після застосування
- Рекомендована норма виливу робочого розчину 200-350 л/га. Для внесення рекомендується використовувати двоплощинні форсунки (наприклад, IDTA або IDKT) з розміром крапель близько 450–600 мкм, що забезпечують рівномірне покриття поверхні ґрунту та мінімізують знесення



Від поля — до врожаю.
Від урожаю — до світових ринків.

FMC An Agricultural Sciences Company

Саксессор™

Гербіцид