


Пойнтер®

Гербіцид

Селективний системний гербіцид для післясходового контролю широкого спектра однорічних та деяких багаторічних дводольних бур’янів у посівах зернових колосових культур та гібридів соняшнику з властивістю Експрес®. Анти осотове рішення для сівозміни.

ОПИС ПРЕПАРАТУ

Пойнтер® 75 в.г.



Діюча речовина: трибенурон-метил 750 г/кг

Препаративна форма: водорозчинні гранули (в.г.)

Реєстрація:

Озима та яра пшениця
Ячмінь ярий та озимий
Жито, овес, тритікале та просо
Соняшник (гібриди стійкі до трибенурон-метилу)

Норма використання:

Зернові колосові культури: 15-25 г/га
Соняшник (гібриди стійкі до трибенурон-метилу): 30-50 г/га

Паковання: пластмасова банка 500 г

РЕЄСТРАЦІЯ


FMC An Agricultural Sciences Company

Культура	Норма витрати	Спектр дії	Фаза внесення	Кратність обробок
Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий	15-25 г/га	Чутливі дводольні бур'яни у стадії 2-6 листків, підмаренник чіпкий до 4-х кілець, осот польовий – розетка – початок стеблування	Від фази 2-3 листків до прапорцевого листка культури	1 за сезон
Жито	20-25 г/га			
Овес, тритікале, просо	15-20 г/га			
Соняшник (гібриди стійкі до трибенурон-метилу)	30-50 г/га + ПАР Тренд® 90 250-300 мл/га	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	2 – 8 листків у культури у ранні фази розвитку бур'янів	1 за сезон

Контроль найбільш проблемних дводольних бур'янів у посівах соняшнику технології Експрес®

FMC An Agricultural Sciences Company

Культура	Препарат	Норма витрати	Фаза застосування
Соняшник (гібриди з властивістю Експрес™)	**Пойнтер® 75 ВГ**	**30-50 г/га + ПАР Тренд® 90 0,25-0,3 л/га**	**2-8 листків у культури. Ранні фази розвитку бур'янів.**



- **Амброзія* (2 листки), окрім АЛС резистентних популяцій**
- Біфора променистa
- Вероніка, види
- Волошка синя
- **Галінсога дрібноквіткова**
- **Гірчак, види**
- **Гірчиця польова**
- **Грицики звичайні**
- Дворядник, види
- **Дурман звичайний**
- **Жабрій, види**
- **Жовтозілля звичайне**
- **Зірочник середній**
- **Канатник Теофраста**
- Кропива глуха
- **Кучерявець Софії**
- **Лобода, види**
- **Лутига, види**
- Мак дикий
- Морква дика
- **Нетреба звичайна (2 листки)**
- Незабудка польова
- **Осот, види**
- **Падалиця традиційного соняшнику, ріпаку**
- **Паслін чорний**
- **Підмаренник чіпкий**
- **Переліска однорічна**
- Празелень звичайна
- **Редька дика**
- Ромашка, види
- Рутка лікарська
- **Талабан польовий**
- **Щириця*, види**

*** окрім АЛС резистентних популяцій**

ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПРЕС®

- Надає можливість післясходового контролю широкого спектра дводольних бур'янів.
- **Висока ефективність проти проблемних/високорослих видів бур’янів: лободи, щириці, пасльону, дурману, канатника, нетреби, амброзії, падалиці ріпаку, та інших.**
- **Протиосотове рішення в сівозміні.**
- **Висока селективність до спеціалізованих гібридів соняшнику.**
- **Широке вікно застосування (від 2 до 8 листків культури).**
- **Допомагає розкрити потенціал врожайності культури.**
- Висока сумісність з фунгіцидами та інсектицидами (окрім фосфорорганічних).
- Висока економічна рентабельність у порівнянні іншими технологіями.
- Партнер для програм комбінованого захисту з досходовими гербіцидами, наприклад **Саксессор™**, **Саксессор ™ Т**.



Гібриди соняшника із властивістю Експрес® (2027)

FMC An Agricultural Sciences Company

- **Pioneer**: P63LE166, P63LE193, P64LE185, P64LE168, P64LE25, P64LE163, P64LE218, P64LE280, P63HE189, P64HE418, P 64HE188, P64BE800.
- **Syngenta**: Суомі, Сузука, Сунаріс, Суміко, Сурест, Сайберік, Сувора, Сурелі, Субео, Суліано, СИ Іріса, АР, СИ Корсіка АР.
- **Limagrain**: ЛГ59580, ЛГ50479 СХ, ЛГ50529 СХ, ЛГ50549 СХ, ЛГ50779 СХ, ЛГ50639 СХ, ЛГ50689 СХ, ЛГ50449 СХ, ЛГ50489 СХ, ЛГ50459 СХ.
- **Lidea**: ЕС ЦЕЙЛОН СУ, ЕС ЛОНДОН СУ, 5053Л СУ, ЕС АРМОНІКА, ЕС АРОМАТІК СУ.
- **MAS Seeds**: MAS 852SU, MAS 823SU, MAS 900SU, MAS 85SU, MAS 83SU.
- **Bayer**: Гудзон, Суппортер СУ.
- **MAY Seed**: M94C35.
- **RAGT**: РЖТ ВОЛЛТЕР СУ, РЖТ ГАЛЛАКСІ СУ.
- *+ є ряд інших гібридів інших компаній*

Технологія Експрес®:

- 20 років на ринку
- 2026: 2,2 млн га (40%)
- 2027 (очікування): 2,5 млн га

Рекомендації щодо використання

З ГЕРБІЦИДАМИ ПРОТИ ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ

Для розширення спектру та/чи покращення дії, рекомендуються бакові суміші **Пойнтер®** з гербіцидами:

- **Сальса®:** берізка польова, інші види
- **Геліантекс® (** Arylex® Active / галаксифен-метил): амброзія полинолиста, інші види

З ГЕРБІЦИДАМИ ПРОТИ ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ

- Для забезпечення **максимальної** селективності щодо культури **НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** змішувати **Пойнтер®** з граміцидами.
- Для контролю злакових бур'янів рекомендується :
  - проводити контроль злакових бур'янів:
    - за допомогою ґрунтових гербіцидів, наприклад з використанням **Саксессор™**, **Саксессор ™ Т.**
    - Післясходових граміцидів - до або через 7 днів після внесення **Пойнтер®.**

- Дотримуватися розриву в 7 днів між внесеннями з **ФОСФОРОРГАНІЧНИМИ ІНСЕКТИЦИДАМИ**.
- Норма витрати робочої рідини: 150-300 л/га.
- **Використовувати з оригінальним ПАР Тренд® 90 250–300 мл/га, (0,125-0,15% концентрації)**

Застереження щодо використання

- Не застосовуйте **Пойнтер®** якщо культура знаходиться в стресовому стані:
  - внаслідок посухи або перезволоження ґрунту, якщо відбувається значне коливання денної і нічної температури повітря, якщо соняшник знаходиться в стані стресу від нестачі поживних речовин, ушкодження заморозками, шкідниками, градом, раніше застосованих гербіцидів або за інших фізичних ушкоджень рослин.
- Не застосовуйте **Пойнтер®** якщо температура нижча, ніж +10°С або вище, ніж +25°С. В спекотливу погоду обприскування проводити лише у вечірні та нічні години.
- Не застосовуйте **Пойнтер®** після великого дощу протягом щонайменше 3 днів або до часу, коли надлишок вологи не вийде з ґрунту.
- Не застосовуйте **Пойнтер®** в кількості понад 50 г/га за сезон.
- **Використовувати з оригінальним ПАР Тренд® 90.**
- Норма витрати робочої рідини: 150-300 л/га.

Контроль падалиці Експрес-стійкого соняшнику

Для контролю падалиці соняшнику стійкого до **Експрес®, Експрес® Голд, Пойнтер®** в наступних культурах сівозміни рекомендується використовувати:

- **на зернових культурах:**
  - Фаместра®, інші гербіциди, такі як Еллай Супер® в бакових сумішах з гербіцидами на основі д.р. флорасулам, флуроксипір, дикамба, 2,4-Д,
  - 2М4Х, клопіралід, амінопіралід.
- **на кукурудзі:**
  - Хармоні®, Нікіт®, в бакових сумішах з гербіцидами на основі д.р. 2,4-Д, дикамба, флорасулам, клопіралід , амінопіралід.
- **на сої:**
  - Коммандо®, та/або гербіциди на основі д.р. бентазон.

ПАР Тренд®90

Поверхнево-активна речовина неіонного типу для підсилення дії гербіцидів FMC.



Рекомендації

- Використовуйте оригінал.
- Норма використання: 0,25-0,3 л/га
- Концентрація: 0,125-0,15%
- Важливо для контролю:
  - амброзії, нетреби
  - лободи, гірчаків, пасльону
  - падалиці ріпаку та капустяних видів бур’янів
  - злакових* бур’янів (побічний ефект)
  - в посушливих умовах

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

FMC An Agricultural Sciences Company

Данадим® Мікс 0,8 - 1,5 л/га

Фуфанон® 0,6 - 0,8 л/га

Джалентра® 0,3 - 0,4 л/га

Вантакор® 0,05- 0,06 л/га

Кораген® 0,15 - 0,175 л/га

Семафор® 2,0 - 2,5 л/т

Пікус® 8,0 - 12,0 л/т


Саксессор™ 600 1,5 - 2,0 л/га

Саксессор™ Т 3,0 - 4,0 л/га

Імпакт ® К 0,8 - 1,0 л/га

Тремізія™ 0,4 - 0,5 л/га

Сальса® 25 г/га + ПАР Тренд™ 90 0,3 л/га



ЕКСПРЕС® ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

FMC An Agricultural Sciences Company

Данадим® Мікс 0,8-1,5 л/га

Фуфанон® 0,6-0,8 л/га

Джалентра® 0,3 - 0,4 л/га

Вантакор® 0,05- 0,06 л/га

Кораген® 0,15 - 0,175 л/га

Семафор® 2,0-2,5 л/т

Пікус 8,0-12,0 л/т

Саксессор™ 1,5-2,0 л/га

Саксессор™ Т 3,0-4,0 л/га

Імпакт ® К 0,8-1,0 л/га


Тремізія™ 0,4-0,5 л/га

Експрес® 20-50 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,3 л/га

Експрес® Голд 35-40 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,3 л/га

Пойнтер® 30-50 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,3 л/га

Сальса® 25 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,3 л/га



ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУРАХ

FMC An Agricultural Sciences Company

- **Ефективність** проти широкого спектру важкоконтрольованих бур’янів, особливо таких як види осоту, підмаренник чіпкий, лобода біла, волошка синя, мак польовий, та багатьох інших.
- **Висока селективність** щодо зернових колосових культур.
- **Широке вікно внесення** – від появи 2-3-х листків (в т.ч. в осінній період) до прапорцевого листка культури.
- **Низька норма внесення** (15–25 г/га), що забезпечує простоту та зручність у використанні.
- **Ефективний від +5°С** (середньодобова).
- **Відсутність обмежень у сівозміні**.
- **Швидкість дії**: зупинка росту бур’янів через 2–3 години, загибель через 2–4 тижні.
- **Сумісний** з більшістю пестицидів, що дає змогу застосовувати **Пойнтер®** у комплексному захисті.
- Дощ, що випав через три години після обробки, не знижує ефективності препарату

СПЕКТР ДІЇ

Ефективність проти однорічних бур’янів

- **Пойнтер®** зазвичай є більш ефективним, коли його використовують на ранніх стадіях розвитку активно вегетуючих бур’янів. Важливо контролювати стадію розвитку бур’янів (2-8 листків), щоб визначити найбільш ефективний період для використання гербіциду.


Ефективність проти багаторічних бур’янів


- **Осот рожевий:** системна дія дає змогу проникати через листя до коренів та різом. Найкращий період контролю осоту рожевого у фазі розетки — початку стеблування.
- Високий рівень контролю: **молокан (латук) татарський, кульбаба лікарська, куколиця біла, щавель види.**
- Стримуюча дія (пригнічення): **Полин звичайний.**

СПЕКТР ДІЇ

Чутливі двосім’ядольні бур’яни:
норма внесення — 20-25 г/га + ПАР Тренд 90 0,25-0,3 л/га

Біфора промениста (Bifora radians)
Гірчиця, види (Sinapis spp.)
Горошок, види (Vicia spp.)
Грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris)
Дворядник, види (Diplotaxis spp.)
Жабрій, види (Galeopsis spp.)
Жовтець, види (Ranunculus spp.)
Жовтозілля звичайне (Senecio vulgaris)
Зірочник середній (Stellaria media)
Злинка канадська (Erigeron canadensis)
Капуста дика (Brassica campestris)
Кропива, види (Lamium spp.)
Куколиця, види (Melandrium spp.)
Кучерявець, види (Descurainia spp.)
Латук (Молокан), види (Lactuca spp.)
Лутига, види (Atriplex spp.)
Мак дикий (Papaver rhoeas)
Міагрум пронизанолистий (Myagrum perfoliatum)
Незабудка польова (Myosotis arvensis)
Осот, види (Cirsium spp.)
Переліска, види (Mercurialis spp.)
Приворотень польовий (Aphanes arvensis)
Редька дика (Raphanus raphanistrum)
Роман, види (Anthemis spp.)
Ромашка, види (Matricaria spp.)
Соняшник, падалиця (Heliantus annuus)
Сухоребрик, види (Sisymbrium, spp.)
Талабан польовий (Thlaspi arvense)
Хрінниця, види (Lepidium spp.)
Шпергель звичайний (Spergula arvensis)
Падалиця ріпаку (Brassica napus)



СПЕКТР ДІЇ

Чутливі двосім’ядольні бур’яни
(норма внесення — 25 г/га)

Гречка витка березковидна (Polygonum convolvulus)
Калачики непомітні (Malva neglecta)
Королиця, види (Chrysanthemum spp.)
Кульбаба лікарська (Taraxacum officinale)
Лобода біла (Chenopodium album)
Осот жовтий (польовий) (Sonchus arvensis)
Підмаренник чіпкий (3-4 міжвузля) (Galium aparine)
Щавель, види (Rumex spp.)



Середньчутливі двосім’ядольні бур’яни
(норма внесення — 25 г/га)


Амброзія (сім’ядолі - 2 листки) (Ambrosia artemisiifolia)
Волошка синя (до 5 см) (Centaurea cyanus)
Фіалка польова (Viola arvensis)
Рутка лікарська (Fumaria officinalis L.)

СЕЛЕКТИВНІСТЬ ТА ГНУЧКІСТЬ

Селективний до пшениці та ячменю від стадії 2-3 листків до прапорцевого листка включно

Пойнтер®

Ефективний від +5˚ С середньодобової температури



ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

FMC An Agricultural Sciences Company

Фуфанон® 1,2 л/га

Вантекс 0,06-0,07 л/га

Імпакт® К 0,6-0,8 л/га

Данадим ® Мікс 1,0 л/га

Імпакт® 500 0,25 л/га

Імпакт® 500 0,25 л/га

Тремізія™ 0,4-0,5 л/га

Імпакт® Т 0,6-1,0 л/га

Еллай® Супер 15 г/га+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Фамістра® 20-30 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Калібр® 40-50 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Пойнтер® 15-25 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Пікус 0,3-0,85 л/т

Вінцит® Форте 1,25 л/т



ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ЯЧМЕНЮ

FMC An Agricultural Sciences Company

Імпакт®500 0,25 л/га


Фаместра® 20-30 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Калібр® 40-50 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Пойнтер® 15-25 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Пікус
0,3-0,85 л/т

Вінцит® Форте
1,25 л/т



FMC An Agricultural Sciences Company

Шукайте детальну інформацію на нашому сайті

ag.fmc.com/ua/uk

та завантажуйте електронний каталог FMC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Повне портфоліо компанії завжди під рукою

Завантажуйте та будьте постійно на зв'язку з нами!

