


Пойнтер®

Гербіцид

Селективний системний гербіцид для післясходового контролю широкого спектра однорічних та деяких багаторічних дводольних бур’янів у посівах зернових колосових культур та гібридів соняшнику з властивістю Експрес®. Анти осотове рішення для сівозміни.

ОПИС ПРЕПАРАТУ

Пойнтер® 75 в.г.



Діюча речовина: трибенурон-метил 750 г/кг

Препаративна форма: водорозчинні гранули (в.г.)

Реєстрація:

Озима та яра пшениця
Ячмінь ярий та озимий
Жито, овес, тритікале та просо
Соняшник (гібриди стійкі до трибенурон-метилу)

Норма використання:

Зернові колосові культури: 15-25 г/га
Соняшник (гібриди стійкі до трибенурон-метилу): 30-50 г/га

Паковання: пластмасова банка 500 г

РЕЄСТРАЦІЯ


FMC An Agricultural Sciences Company

Культура	Норма витрати	Спектр дії	Фаза внесення	Кратність обробок
Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий	15-25 г/га	Чутливі дводольні бур'яни у стадії 2-6 листків, підмаренник чіпкий до 4-х кілець, осот польовий – розетка – початок стеблування	Від фази 2-3 листків до прапорцевого листка культури	1 за сезон
Жито	20-25 г/га			
Овес, тритікале, просо	15-20 г/га			
Соняшник (гібриди стійкі до трибенурон-метилу)	30-50 г/га + ПАР Тренд® 90 250-300 мл/га	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	2 – 8 листків у культури у ранні фази розвитку бур'янів	1 за сезон

Контроль найбільш проблемних дводольних бур'янів у посівах соняшнику технології Експрес®

FMC An Agricultural Sciences Company

Культура	Препарат	Норма витрати	Фаза застосування
Соняшник (гібриди з властивістю Експрес™)	**Пойнтер® 75 ВГ**	**30-50 г/га + ПАР Тренд® 90 0,25-0,3 л/га**	**2-8 листків у культури. Ранні фази розвитку бур'янів.**



- **Амброзія* (2 листки), окрім АЛС резистентних популяцій**
- Біфора променистa
- Вероніка, види
- Волошка синя
- **Галінсога дрібноквіткова**
- **Гірчак, види**
- **Гірчиця польова**
- **Грицики звичайні**
- Дворядник, види
- **Дурман звичайний**
- **Жабрій, види**
- **Жовтозілля звичайне**
- **Зірочник середній**
- **Канатник Теофраста**
- Кропива глуха
- **Кучерявець Софії**
- **Лобода, види**
- **Лутига, види**
- Мак дикий
- Морква дика
- **Нетреба звичайна (2 листки)**
- Незабудка польова
- **Осот, види**
- **Падалиця традиційного соняшнику, ріпаку**
- **Паслін чорний**
- **Підмаренник чіпкий**
- **Переліска однорічна**
- Празелень звичайна
- **Редька дика**
- Ромашка, види
- Рутка лікарська
- **Талабан польовий**
- **Щириця*, види**

*** окрім АЛС резистентних популяцій**

ПЕРЕВАГИ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПРЕС®

- Надає можливість післясходового контролю широкого спектра дводольних бур'янів.
- **Висока ефективність проти проблемних/високорослих видів бур’янів: лободи, щириці, пасльону, дурману, канатника, нетреби, амброзії, падалиці ріпаку, та інших.**
- **Протиосотове рішення в сівозміні.**
- **Висока селективність до спеціалізованих гібридів соняшнику.**
- **Широке вікно застосування (від 2 до 8 листків культури).**
- **Допомагає розкрити потенціал врожайності культури.**
- Висока сумісність з фунгіцидами та інсектицидами (окрім фосфорорганічних).
- Висока економічна рентабельність у порівнянні іншими технологіями.
- Партнер для програм комбінованого захисту з досходовими гербіцидами, наприклад **Саксессор™**, **Саксессор ™ Т**.



Гібриди соняшника із властивістю Експрес® (2027)

FMC An Agricultural Sciences Company

- **Pioneer**: P63LE166, P63LE193, P64LE185, P64LE168, P64LE25, P64LE163, P64LE218, P64LE280, P63HE189, P64HE418, P 64HE188, P64BE800.
- **Syngenta**: Суомі, Сузука, Сунаріс, Суміко, Сурест, Сайберік, Сувора, Сурелі, Субео, Суліано, СИ Іріса, АР, СИ Корсіка АР.
- **Limagrain**: ЛГ59580, ЛГ50479 СХ, ЛГ50529 СХ, ЛГ50549 СХ, ЛГ50779 СХ, ЛГ50639 СХ, ЛГ50689 СХ, ЛГ50449 СХ, ЛГ50489 СХ, ЛГ50459 СХ.
- **Lidea**: ЕС ЦЕЙЛОН СУ, ЕС ЛОНДОН СУ, 5053Л СУ, ЕС АРМОНІКА, ЕС АРОМАТІК СУ.
- **MAS Seeds**: MAS 852SU, MAS 823SU, MAS 900SU, MAS 85SU, MAS 83SU.
- **Bayer**: Гудзон, Суппортер СУ.
- **MAY Seed**: M94C35.
- **RAGT**: РЖТ ВОЛЛТЕР СУ, РЖТ ГАЛЛАКСІ СУ.
- *+ є ряд інших гібридів інших компаній*

Технологія Експрес®:

- 20 років на ринку
- 2026: 2,2 млн га (40%)
- 2027 (очікування): 2,5 млн га

Рекомендації щодо використання

З ГЕРБІЦИДАМИ ПРОТИ ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ

Для розширення спектру та/чи покращення дії, рекомендуються бакові суміші **Пойнтер®** з гербіцидами:

- **Сальса®:** берізка польова, інші види
- **Геліантекс® (** Arylex® Active / галаксифен-метил): амброзія полинолиста, інші види

З ГЕРБІЦИДАМИ ПРОТИ ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ

- Для забезпечення **максимальної** селективності щодо культури **НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** змішувати **Пойнтер®** з граміцидами.
- Для контролю злакових бур'янів рекомендується :
  - проводити контроль злакових бур'янів:
    - за допомогою ґрунтових гербіцидів, наприклад з використанням **Саксессор™**, **Саксессор ™ Т.**
    - Післясходових граміцидів - до або через 7 днів після внесення **Пойнтер®.**

- Дотримуватися розриву в 7 днів між внесеннями з **ФОСФОРОРГАНІЧНИМИ ІНСЕКТИЦИДАМИ**.
- Норма витрати робочої рідини: 150-300 л/га.
- **Використовувати з оригінальним ПАР Тренд® 90 250–300 мл/га, (0,125-0,15% концентрації)**

Застереження щодо використання

- Не застосовуйте **Пойнтер®** якщо культура знаходиться в стресовому стані:
  - внаслідок посухи або перезволоження ґрунту, якщо відбувається значне коливання денної і нічної температури повітря, якщо соняшник знаходиться в стані стресу від нестачі поживних речовин, ушкодження заморозками, шкідниками, градом, раніше застосованих гербіцидів або за інших фізичних ушкоджень рослин.
- Не застосовуйте **Пойнтер®** якщо температура нижча, ніж +10°С або вище, ніж +25°С. В спекотливу погоду обприскування проводити лише у вечірні та нічні години.
- Не застосовуйте **Пойнтер®** після великого дощу протягом щонайменше 3 днів або до часу, коли надлишок вологи не вийде з ґрунту.
- Не застосовуйте **Пойнтер®** в кількості понад 50 г/га за сезон.
- **Використовувати з оригінальним ПАР Тренд® 90.**
- Норма витрати робочої рідини: 150-300 л/га.

Контроль падалиці Експрес-стійкого соняшнику

Для контролю падалиці соняшнику стійкого до **Експрес®, Експрес® Голд, Пойнтер®** в наступних культурах сівозміни рекомендується використовувати:

- **на зернових культурах:**
  - Фаместра®, інші гербіциди, такі як Еллай Супер® в бакових сумішах з гербіцидами на основі д.р. флорасулам, флуроксипір, дикамба, 2,4-Д,
  - 2М4Х, клопіралід, амінопіралід.
- **на кукурудзі:**
  - Хармоні®, Нікіт®, в бакових сумішах з гербіцидами на основі д.р. 2,4-Д, дикамба, флорасулам, клопіралід , амінопіралід.
- **на сої:**
  - Коммандо®, та/або гербіциди на основі д.р. бентазон.

ПАР Тренд®90

Поверхнево-активна речовина неіонного типу для підсилення дії гербіцидів FMC.



Рекомендації

- Використовуйте оригінал.
- Норма використання: 0,25-0,3 л/га
- Концентрація: 0,125-0,15%
- Важливо для контролю:
  - амброзії, нетреби
  - лободи, гірчаків, пасльону
  - падалиці ріпаку та капустяних видів бур’янів
  - злакових* бур’янів (побічний ефект)
  - в посушливих умовах

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

FMC An Agricultural Sciences Company

Данадим® Мікс 0,8 - 1,5 л/га

Фуфанон® 0,6 - 0,8 л/га

Джалентра® 0,3 - 0,4 л/га

Вантакор® 0,05- 0,06 л/га

Кораген® 0,15 - 0,175 л/га

Семафор® 2,0 - 2,5 л/т

Пікус® 8,0 - 12,0 л/т


Саксессор™ 600 1,5 - 2,0 л/га

Саксессор™ Т 3,0 - 4,0 л/га

Імпакт ® К 0,8 - 1,0 л/га

Тремізія™ 0,4 - 0,5 л/га

Сальса® 25 г/га + ПАР Тренд™ 90 0,3 л/га



ЕКСПРЕС® ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

FMC An Agricultural Sciences Company

Данадим® Мікс 0,8-1,5 л/га

Фуфанон® 0,6-0,8 л/га

Джалентра® 0,3 - 0,4 л/га

Вантакор® 0,05- 0,06 л/га

Кораген® 0,15 - 0,175 л/га

Семафор® 2,0-2,5 л/т

Пікус 8,0-12,0 л/т

Саксессор™ 1,5-2,0 л/га

Саксессор™ Т 3,0-4,0 л/га

Імпакт ® К 0,8-1,0 л/га


Тремізія™ 0,4-0,5 л/га

Експрес® 20-50 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,3 л/га

Експрес® Голд 35-40 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,3 л/га

Пойнтер® 30-50 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,3 л/га

Сальса® 25 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,3 л/га



FMC An Agricultural Sciences Company

Шукайте детальну інформацію на нашому сайті

ag.fmc.com/ua/uk

та завантажуйте електронний каталог FMC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Повне портфоліо компанії завжди під рукою

Завантажуйте та будьте постійно на зв'язку з нами!

